




РИСУНОК МАКСИМА СМАГИНА

Вот летит карамора

Комар-долгоножка в распространении малярии не виноват, но у него есть вредная родня

Нынешнее лето с его обильными дождями и теплом – настоящий рай для комаров. Полчища мелких, надсадно звенящих и кусачих насекомых изрядно досаждают людям. Однако панический ужас вызывает не эта мелочь, а огромные комары на длинных ножках. Каких только ужасов им не приписывают: и всю кровь-то они могут выпить, и малярию разносят.

Все это враки! Комар-долгоножка, несмотря на свой страшный вид, не кусается, кровь человека не разносит. У него, в отличие от своих мелких сородичей, напроць отсутствует колюще-сосущий аппарат. Большинство взрослых особей этого великана вообще ничего не едят, им хватает запасов, накопленных на стадии личинки. Некоторые долгоножки пьют нектар цветов и обычную росу.

К распространению малярии комар-долгоножка вообще никакого отношения не имеет. Переносчиками болотной лихорадки

являются самки комаров рода анофелес – мелкие, мало отличимые от обычных комаров. Зараза попадает в их организм вместе с кровью больного человека, а затем передается здоровым людям при укусах.

В общем, бояться длинноножек не стоит, большинство из них даже полезны. Практически весь отпущенный ей недолгий срок жизни карамора проводит в форме личинки в сырой почве, воде или под корой. Личинки активно перерабатывают гниющие растительные остатки, превращая их в гумус и участвуя тем самым в почвообразовании. К тому же личинки и взрослые особи являются пищей для птиц, лягушек, жаб, ящериц, пауков.

А вот земледельцам, в том числе и садоводам, отдельные виды комара-долгоножки способны навредить. Самая опасная из них – вредная болотная или льняная долгоножка. Обильно она размножается при повышенной влажности, на верховых торфяниках и тяжелых кислых почвах. Ее личинки повреждают различные полевые, овощные, ягодные культуры, травы

на сеяных и естественных лугах, а также деревянистые растения – хмель, иву, яблоню, дуб, березу, ольху.

Внешне отличить долгоножку вредную от безвредных неспециалисту невозможно. Насторожиться стоит тем, чьи сады и огороды размещены в низинах, на землях, склонных к переувлажнению. Очаги вредителя размещаются на участках с плохим дренажем или высоким уровнем грунтовых вод.

Избавиться от личинок вредной долгоножки, которая весной повреждает корни растений, помогут агротехнические мероприятия: уход за дренажной системой, известкование кислых почв, уничтожение сорняков, глубокая вспашка после уборки урожая.

К биологическим методам борьбы относится выпуск на грядки, в компостные ямы и теплицы нематод *Steinernema carpocapsae* (Штейнернема карпокапсе), которые эффективно уничтожают личинки болотной долгоножки. Препараты с этим хищником продают в магазинах и на маркетплейсах.

Татьяна БУРОВА

Трава у дома: косить или оставить

По вопросу, который вынесен в заголовок, среди садоводов нет единства. Одни считают, что газон должен быть аккуратно подстрижен «ежиком», другие предпочитают естественную лохматость – траву с вкраплениями ромашек, васильков, колокольчиков. Что же предпочтительней?

Не секрет, что в СНТ сейчас много заброшенных участков, заросших различными зонтичными растениями, ре-

пейником, прочими дикоросами. С такой бурьянистой растительностью надо бороться. Причем скашивать ее нужно регулярно, пока она еще не набрала силу, пока не созрели семена. Иначе она заполонит весь участок – ваш и соседние.

Высокая трава является приютом для вредителей, клещей. А когда пожухнет – создаст условия для возникновения пожаров.

А вот луговые газоны с разнотравьем следует косить всего

один – два раза за сезон. Более частая косьба приведет к гибели экосистемы: исчезнут дикие цветы, травы, а вместе с ними – и полезные насекомые, некоторые виды птиц. К тому же нестриженная трава помогает удерживать влагу в почве, улучшает ее аэрацию.

После покоса скошенную траву лучше собрать и вывезти, а не оставлять лежать: в ней могут завестись насекомые и бактерии.

Татьяна БУРОВА

Аптечка для дачи

Каким бы прекрасным ни было наше пребывание в саду или на даче, оно может сопровождаться и неприятностями. Чтобы подстраховаться от ожогов, порезов, укусов насекомых, аллергических реакций и прочих рисков, нужно иметь под рукой аптечку скорой помощи.

Что в нее следует положить?

Во-первых, под рукой следует иметь препараты, назначенные врачом, если есть хронические заболевания: астма, гипертония, тахикардия и т. п.

Во-вторых, в дачной аптечке следует держать перевязочные материалы, лейкопластыри, охлаждающие пакеты, спиртовые салфетки. Хорошо также иметь пару тактических жгутов, а также фиксаторы на случай переломов.

В-третьих, препараты для непредвиденных ситуаций.

На случай отравлений и кишечных расстройств – сорбенты типа активированного угля; регидрон – порошок, который восстанавливает водно-солевой баланс.

Обязательны жаропонижающие, особенно если вы едете на дачу с детьми. Антигистаминные препараты спасут, если возникнет аллергическая реакция на растения или укус насекомого.

Для обработки ранок и царапин нужны зеленка, йод, перекись водорода (3%), раствор хлоргексидина.

Обязательны и противовирусные препараты – те, что вам знакомы.

- Сорбенты надо принимать натощак и не смешивать их с другими лекарственными препаратами.

Самолечением можно заниматься, если кишечное расстройство, простуда или травма несерьезные и хорошее самочувствие быстро восстанавливается. Но не нужно геройствовать, если положение серьезное.

Обратитесь за медицинской помощью, если:

- получены сильные ожоги, глубокие порезы;
- прием антигистаминного препарата не помог, аллергическая реакция нарастает;
- температура 38 градусов и выше держится в течение двух дней;
- частые расстройства стула, повторяющиеся приступы рвоты;
- боль в мышцах держится дольше 4–5 дней и не ослабевает.

Как защитить урожай от птиц

Несмотря на капризы нынешнего лета, в садах свердловчан наливаются соком смородина всех цветов, крыжовник, клубника, облепиха и прочая ягода. Рады этому не только садоводы, но и дрозды, скворцы, воробьи и другие пернатые лакомки. Конечно, люди готовы делиться с птицами, но все же хотят уберечь большую часть урожая. Как это сделать?

В прежние годы популярностью пользовались блестящие и шумные самодельные отпугиватели. В ход у садоводов шла фольга, CD- и DVD-диски, елочная мишура и «дождик». Их развешивали на ветках или на веревках, натянутых над ягодными кустами. Они сияли на солнце и шелестели. Первое время птицы действительно боялись этого свето-шумового оркестра, но быстро смекнули, что это обман, и перестали обращать на него внимание.

Затем в ход пошли классические пугала, а также воздушные змеи в виде ястребов, соколов. Поначалу парящий в воздухе силуэт хищника отпугивал пернатых, но потом они к нему привыкли и продолжали спокойно склевывать ягоды.



ГАЛИНА СОЛОВАЕВА

Защитная сетка для птиц смотрится декоративно

Самым эффективным средством оказались мелкаячеистые сетки, накиннутые на куст или натянутые на каркас над ягодниками и невысокими плодовыми деревьями. Нужно лишь как следует закрепить края сетки, чтобы птицы в ней не запутались.

«Хорошо работают и растения-отвлекатели – посаженные по периметру сада специально для птиц шелковица, ирга, рябина, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Могут также отвлечь от ваших ягод поилки и кормушки, размещенные в стороне от посадок. Сытые птицы меньше интересуются вашей клубникой.

В последние годы в магазинах и маркетплейсах продают ультразвуковые и биоакустические отпугиватели, имитирующие крики хищных птиц или тревожные сигналы. Но, во-первых, они недешевы, во-вторых, неизвестно, как среагирует на них ваша нервная система и домашние питомцы.

Татьяна БУРОВА